

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при позиційному стисканні м'яких тканин

Позиційне стискання м'яких тканин — це вид травми, при якій до певної частини тіла постраждалого припиняється кровопостачання, внаслідок чого розвиваються її ішемія та ушкодження.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ

ПЕРЕКОНАТИСЯ У ВІДСУТНОСТІ НЕБЕЗПЕКИ

ПРОВЕСТИ ОГЛЯД ПОСТРАЖДАЛОГО,
ВИЗНАЧИТИ НАЯВНІСТЬ СВІДОМОСТІ ТА ДИХАННЯ

ВИКЛИКАТИ БРИГАДУ ЕМД

ЯКЩО ДИХАННЯ ВІДСУТНЕ
РОЗПОЧАТИ СЛР

ЯКЩО ПОСТРАЖДАЛИЙ У
СВІДОМОСТІ

- виконати фіксацію шийного відділу хребта;
- з'ясувати час стискання;
- якщо пройшло менше ніж 10 хв., звільнити стиснену частину тіла;
- при можливості обробити рани, іммобілізувати ушкоджену кінцівку;
- за наявності ознак шоку надати постраждалому протишокове положення;
- вкрити постраждалого термопокривалом/покривалом;
- якщо з моменту стискання пройшло більше ніж 10 хвилин, дочекатися приїзду ЕМД;
- підтримати постраждалого психологічно.

У ВИПАДКУ, КОЛИ НЕОБХІДНО ТЕРМІНОВО ЕВАКУЮВАТИ ПОСТРАЖДАЛОГО, АЛЕ З МОМЕНТУ СТИСКАННЯ ПРОЙШЛО БІЛЬШЕ НІЖ 10 ХВИЛИН, ПЕРЕД ЗВІЛЬНЕННЯМ СТИСНУТОЇ ЧАСТИНИ ТІЛА НАКЛАСТИ ДЖГУТ

ЯКЩО ПОСТРАЖДАЛИЙ БЕЗ СВІДОМОСТІ, АЛЕ В НЬОГО НАЯВНЕ ПРАВИЛЬНЕ ДИХАННЯ І НЕ ВІДОМО СКІЛЬКИ ЧАСУ ПРОЙШЛО З МОМЕНТУ СТИСКАННЯ, ВВАЖАТИ, ЩО ПРОЙШЛО БІЛЬШЕ НІЖ 10 ХВ.

ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПОСТІЙНИЙ НАГЛЯД ЗА ПОСТРАЖДАЛИМ ДО ПРИБУТТЯ ЕМД.
ПРИ ПОГІРШЕННІ СТАНУ ПОВТОРНО ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ ДИСПЕТЧЕРУ